

動物用医薬品医療機器要覧（2016年度版）正誤表

頁	正	誤
441	水産用ベネサール（下記内容に修正）	水産用ベネサール（内容誤記）
<p style="text-align: center;">水産用ベネサール® 使 プラジクアンテル 散剤 散</p> <p>製造販売元 あすかアニマルヘルス株式会社 成分分量 <u>1g</u> 中、<u>プラジクアンテル 500mg</u> 含有 効能効果 <u>スズキ目魚類の体表に寄生するハダムシ（<i>Benedenia seriolae</i>）の駆除。</u> <u>クロマグロを含むスズキ目魚類の住血吸虫（<i>Cardicola opisthorchis</i>）の駆除。</u> 用法用量 魚体重 <u>1kg</u> 当たり 1 日量プラジクアンテルとして下記の量を、水産用展着剤もしくは展着剤を含有した養魚用配合飼料と混合した後、餌料中に均一となるように添加し <u>1 日 1 回</u>、<u>3 日間</u>経口投与する。 <u>スズキ目魚類の体表に寄生するハダムシ（<i>Benedenia seriolae</i>）の駆除：150mg</u>…本品として <u>0.3g</u> <u>クロマグロを含むスズキ目魚類の住血吸虫（<i>Cardicola opisthorchis</i>）の駆除：15mg</u>…本品として <u>0.03g</u> 使用上の注意 ①本剤は、スズキ目魚類の体表に寄生するハダムシ（<i>Benedenia seriolae</i>）及びクロマグロを含むスズキ目魚類に寄生する住血吸虫（<i>Cardicola opisthorchis</i>）を駆除するために使用し、スズキ目魚類以外の魚又は動物には使用しないこと。②本剤は、正しく使用しなければハダムシ（<i>Benedenia seriolae</i>）及び住血吸虫（<i>Cardicola opisthorchis</i>）の駆除効果が得られないおそれがあるので、本使用説明書の【用法及び用量】に従って正しく使用すること。③本剤は必要量以上使用すると、本剤の味に起因する一過性の摂餌不良が認められることがあるため、魚体重 <u>1kg</u> 当たり 1 日量プラジクアンテルとして <u>150mg</u> の投与量を厳守し、摂餌不良が生じないように注意すること。○その他添付文書を参照のこと。 注意 「使用基準」の定めるところにより使用すること。別表第 1、使用禁止期間 <u>スズキ目魚類：10 日間</u> 包装 <u>2kg</u>（500g×4 袋アルミラミネート袋）、<u>10kg</u>[<u>2kg</u>（500g×4 袋アルミラミネート袋）×5 箱]</p>		

頁	正	誤
167~169	「チルミコシン散」製剤 使用禁止期間：豚 <u>4 日間</u>	「チルミコシン散」製剤 使用禁止期間：豚 <u>1 5 日間</u>
31	メデランチル® 向 要 使	メデランチル® 要 使