

動物用医薬品医療機器要覧（2020年版）

頁	正	誤
3	使用禁止期間 豚： 24 時間	右段：マフロパン 1%注射液 使用禁止期間 豚： 24 日間
6	使用上の注意 添付文書を参照のこと。 ・本剤投与後、下記の期間は食用に供する目的 で出荷等を行わないこと。 牛・馬・豚：10 日間 牛乳：36 時間	右段：ネオアス注射液 (使用上の注意の追加)
6	使用上の注意 添付文書を参照のこと。 ・本剤投与後、下記の期間は食用に供する目的 で出荷等を行わないこと。 牛・馬・豚：10 日間 牛乳：36 時間	右段：ネオアス P (使用上の注意の追加)
27	使用上の注意 添付文書を参照のこと。 ・本剤投与後、下記の期間は食用に供する目的 で出荷等を行わないこと。 牛・馬・豚・緬山羊・鶏：7 日間	右段：ビオエンチ (使用上の注意の追加)
100	使用禁止期間 豚：4 日間	右段：プルモチルプレミックス-20, -50 使用禁止期間 豚： 15 日間
122	用法用量の上から 6 行目、3～5 日間。の次に 加える。 1 日 1 回、体重 1kg 当たりオルビフロキサシン として下記の量を牛の静脈内に注射する。牛： 細菌性肺炎 5mg 3 日間	左段：ビクタス注射液 5% (用法用量への追加文書)
142	エコメクチントピカルオン <input type="checkbox"/>	左段： エコメクチントピカルオン <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>